

Solución Oral

COMPOSICIÓN	Cada 1ml contiene:
	Altrenogest 4.0 mg
	Excipientes c.s.p. 1 ml

ESPECIE DESTINO	Cerdos
------------------------	--------

INDICACIONES	Para la sincronización del celo en cerdas sexualmente maduras
---------------------	---

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS	<p>Grupo farmacoterapéutico: Hormonas sexuales y moduladores del sistema reproductor</p> <p>Propiedades Farmacodinámicas:</p> <p>Altrenogest es un progestágeno sintético que pertenece a la familia 19-nor- testosterona. Este progestágeno es activo por la vía oral. Altrenogest actúa mediante la disminución de las concentraciones en plasma de hormonas gonadotropinas endógenas (LH y FSH). Las concentraciones bajas de gonadotropina inducen la regresión de folículos grandes (> 5 mm) y no permiten crecimientos mayores a 3 mm, lo que provoca la ausencia de estro y ovulación durante el tratamiento. El final del tratamiento es seguido por un incremento regular de la concentración de LH en plasma, lo que permite crecimiento folicular y maduración. Después, los animales regresan al estro, de una forma sincronizada.</p>
-----------------------------------	--

CONTRAINDICACIONES	<p>No administrar a animales que presenten infección uterina.</p> <p>No administrar a animales machos.</p> <p>Añadir el producto en el alimento, inmediatamente antes de la alimentación.</p> <p>Desechar el alimento medicado que no haya sido consumido</p> <p>Para ser utilizado solo en cerdas de reemplazo o vientres maduras (primíparas y multíparas) que hayan presentado un estro.</p> <p>El alimento que no se haya consumido en su totalidad debe ser desechado con seguridad y no debe ser suministrado a ningún otro animal.</p>
---------------------------	---

ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN	<p>Para uso oral adicionándolo sobre la ración de alimento.</p> <p>Cerdas de reemplazo: 20 mg de altrenogest/animal, es decir, 5 ml de Altresyn® por animal una vez al día, durante 18 días consecutivos.</p> <p>Vientres: 20 mg de altrenogest/animal, es decir, 5 ml de Altresyn® por animal una vez al día, durante 3 a 18 días consecutivos.</p> <p>Para preparar el dosificador:</p> <ul style="list-style-type: none">- Colocar la botella en posición horizontal y la boquilla del dosificador dirigirla hacia arriba.- Presionar lentamente el disparador hasta que aparezca una gota en la punta de la boquilla.
--------------------------------------	--

El dosificador suministra una dosis de 5 ml para cada activación completa del disparador. Para la administración regular, mantenga el envase al revés en forma vertical. El dosificador debe permanecer sobre la botella durante todo el periodo en que el producto esté en uso, y el sistema de seguridad debe utilizarse para su almacenamiento entre tratamientos.

Los animales deben ser segregados y dosificados de manera individual.

Añadir el producto como un aderezo formando una capa sobre el alimento. Añadir a la parte superior del alimento, inmediatamente antes de la alimentación.

Altresyn® permite mejorar la organización de las unidades de cría, facilitando la gestión de los lotes (asignación de un vientre o grupo de vientres para adaptarse a un nuevo periodo de cría por lotes).

PRECAUCIONES GENERALES

Debe evitarse el contacto directo con la piel. Al manipular el medicamento debe llevarse ropa de protección personal (guantes y batas).

Guantes porosos pueden dejar pasar el producto a la piel. Materiales oclusivos como guantes de látex o goma, pueden aumentar la absorción transcutánea del producto; por tanto, utilice guantes de látex o goma INTACTOS.

En caso de derrame accidental sobre la piel o los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.

Lavarse las manos después del tratamiento y antes de comer.

Personas que no deben manejar el producto:

1. Mujeres que estén o se sospeche puedan estar embarazadas
2. Personas con enfermedades tromboembólicas o con tromboflebitis
3. Personas con afecciones cerebro-vasculares
4. Mujeres con carcinoma de mama, o que se sospeche que puedan padecerlo
5. Personas con neoplasias estrógeno dependientes
6. Mujeres con sangrado vaginal no diagnosticado
7. Personas con disfunción o afecciones hepáticas

Efectos de una sobreexposición: la absorción accidental puede generar la interrupción del ciclo menstrual, contracciones uterinas o abdominales, aumento o disminución de la hemorragia uterina, prolongación de la gestación o dolor de cabeza.

Evitar el contacto directo con la piel.

En caso de sobreexposición por parte del operador, consultar al médico inmediatamente.

En caso de ingestión accidental: No induzca el vómito. Ya que Altresyn® contiene aceite, el vómito debe ser supervisado por un médico. Se requiere atención médica inmediata.

ADVERTENCIAS

Administrar únicamente a cerdas (reemplazos y vientres) sexualmente maduras que ya hayan presentado un celo.

No administrar a animales con infecciones uterinas

No administrar a machos.

Verificar que se administra la dosis correcta. Una subdosificación puede inducir la formación de folículos quísticos.

Descartar los envases vacíos y sobrantes del producto según la reglamentación local vigente.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 15°C y 30°C

Una vez abierto el envase, el producto puede ser utilizado durante un plazo de 2 (dos) meses.

PRESENTACIÓN

Frasco x 540 ml y x 1080 ml



Fabricado por:

Ceva Santé Animale
Z.I. Très le Bois, 22600 Loudéac, Francia

Importado y Distribuido por:

En Colombia: Ceva Salud Animal SAS, Bogotá. Reg ICA 9609-MV
En Ecuador: Rebexa Representaciones S.A. El Calzado Calle S12 No. OE2-495 y Calle OE2L, Quito.
Reg. N° RIP-FAR-214
En Venezuela: Ceva Salud Animal, C.A. J-29606988-3; Productos Swissagro, C.A. J-30310874-1.
Asesor Téc. MV Nerina Alliegro. Reg. No. INSAI2041PI33N055776