



## Vacuna inactivada contra Circovirus Porcino Tipo 2 y adyuvante oleoso

**COMPOSICIÓN**

Cada dosis de 2 mL del producto reconstituido contiene:

Circovirus Porcino Tipo 2 inactivado (PCV2) .....  $\geq 2.1 \log_{10}$  Unidades ELISA

Excipientes c.s.p..... 1 dosis

Cada dosis de 1 mL del producto reconstituido contiene:

Circovirus Porcino Tipo 2 inactivado (PCV2) .....  $\geq 1.8 \log_{10}$  Unidades ELISA

Excipientes c.s.p..... 1 dosis

Adyuvante oleoso: Timerosal

**ESPECIE DESTINO**

Cerdos

**INDICACIONES**

CIRCOVAC® es una vacuna líquida inactivada y adyuvada, indicada para la inmunización activa o pasiva de lechones con el objetivo de reducir en estos la infección, excreción viral, lesiones y síntomas clínicos causados por el Circovirus Porcino Tipo 2 (PCV2), agente del SDML (Síndrome del Desgaste Multisistémico Porcino)

**ADMINISTRACIÓN Y  
DOSIFICACIÓN**

Aplicar 2 mL en cerdas, 0.5 mL en lechones.

Mezclar el contenido del frasco de CIRCOVAC® Suspensión, con el contenido del frasco de CIRCOVAC® Emulsión.

Aplicar por vía intramuscular profunda, de acuerdo con el siguiente esquema de vacunación.

**Cerdas – Primovacación:** 2 dosis con 3-4 semanas de intervalo, por lo menos 2 semanas antes del apareamiento.

**Cerdas – Revacunación:** Una dosis a cada gestación, por lo menos 2 a 4 semanas antes del parto.

**Lechones:** Administrar una dosis única a partir de la 3ª – 4ª semana de edad. Revacunación no es requerida. Vacune solo lechones de madres no vacunadas.

**INSTRUCIONES PARA  
SU USO**

Para usar la vacuna agitar enérgicamente el vial de CIRCOVAC® Suspensión que contiene el antígeno e inyectar su contenido en el vial de CIRCOVAC® Emulsión que contiene el adyuvante. Mezclar suavemente antes de usar. La vacuna reconstituida es una emulsión blanca homogénea.

**ADVERTENCIAS Y  
PRECAUCIONES DE  
USO**

La vacuna puede provocar edema pasajero y una ligera reacción local sin ningún efecto en la salud y reproducción de los animales.

La vacuna puede excepcionalmente provocar reacciones de hipersensibilidad. En este caso, se deberá dar un tratamiento sintomático.

Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en esta ficha, informe del mismo a su veterinario.

Utilizar dentro de las 3 horas después de reconstitución.

Aplicar los procesos habituales para el tratamiento de los animales.

Aplicar el proceso aséptico habitual.

Puede ser utilizado durante la gestación.

Ninguna interacción conocida.

Ningún efecto indeseable aparte de los mencionados anteriormente observados después de la administración de una dosis doble de la vacuna.

No mezclar con otro medicamento.

**Al usuario:** Este producto contiene aceite mineral. Su inyección accidental/auto inyección puede provocar un dolor agudo e inflamación, en particular si se inyecta en una articulación o un dedo; en casos excepcionales puede provocar la pérdida del dedo afectado si no se proporciona atención médica urgente.

En caso de inyectarse accidentalmente con este producto, busque urgentemente asistencia médica, incluso si solo se ha inyectado una cantidad muy pequeña, y lleve el instructivo consigo. Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, diríjase de nuevo a un médico.

**Al médico:** Este producto contiene aceite mineral. Incluso si se han inyectado pequeñas cantidades, la inyección accidental de este producto puede causar inflamación intensa, que puede terminar en necrosis isquémica e incluso la pérdida del dedo. Es necesaria atención médica experta, INMEDIATA, a cargo de un cirujano dado que pudiera ser necesario practicar inmediatamente una incisión e irrigar la zona de inyección, especialmente si están afectados los tejidos blandos del dedo o el tendón.

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

---

**PERIODO DE RETIRO**

Cero días

---

**ALMACENAMIENTO**

Almacene de 2 a 8°C. No congelar. Proteger de la luz

---

**PRESENTACIÓN**

Frascos por 10 mL, 50 mL y 100 mL



**Fabricado por:**

Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.  
1107 Budapest, Szállás U.5., Budapest  
Hungria

**Importado y Distribuido por:**

**En Colombia:** Ceva Salud Animal SAS, Bogotá. Reg ICA 7522-BV

**En Ecuador:** Representado por Rebexa S.A. El Calzado Calle S12 No. OE2-495 y Calle OE2L – Quito.  
Reg. 4A-13343-AGROCALIDAD

**En Perú:** Ceva Salud Animal SAC, Calle José González 681, Miraflores, Lima. Reg. SENASA B.01.20.5.1.0988

**En Venezuela:** Ceva Salud Animal, C.A. J-29606988-3; Productos Swissagro, C.A. J-303108741.

Asesor Téc. MV Nerina Alliegro. Reg. No. INSAI2041PI33N07301