

**Vacuna del Virus de Anemia de Pollo. Virus Vivo**

COMPOSICIÓN	Cada dosis (0.01 ml) contiene: Virus de la Anemia de pollo, Cepa Del Ros $\geq 10^{4.9}$ DITC ₅₀ Excipientes c.s.p..... 1 dosis
--------------------	--

ESPECIE DESTINO	Aves
------------------------	------

INDICACIONES	<p>Para proveer anticuerpos maternos a la progenie como ayuda en la prevención de la Anemia Infecciosa de pollo.</p> <p>La vacuna es suministrada solamente por la ruta del pliegue del ala a gallinas reproductoras de 9 a 12 semanas de edad que sean negativas o tengan una positividad inferior a 70% de la población.</p> <p>No vacunar aves en postura.</p> <p>El virus de la vacuna puede ser diseminado en las heces y huevos de pollos vacunados. Por este motivo, evitar la propagación del virus de la vacuna a aves jóvenes o a ponedoras no expuestas previamente. Además, evitar la vacunación de pollos reproductores de más de 12 semanas de edad para prevenir la transmisión vertical del virus de la vacuna.</p>
---------------------	---

ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN	<p>Usar el aplicador adjunto para administrar cada dosis de 0.01 ml por el método del pinchazo en el pliegue del ala.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Agitar bien antes de abrir. Remover el sello y tapón del envase de la vacuna. La vacuna está lista para el uso.2. Sumergir la aguja del aplicador con doble punta adjunto en la vacuna y pinchar la zona del pliegue del ala en la parte inferior. Evitar perder vacuna asegurándose no tocar las plumas con el aplicador. Evitar contacto con músculo, hueso o vasos sanguíneos mayores.3. Sumergir el aplicador en la vacuna de nuevo entre cada vacunación.
--------------------------------------	---

PRECAUCIONES GENERALES	<p>Utilizar todo el contenido dentro de 4 horas después de abrir.</p> <p>No diluir la vacuna o administrar menos de una dosis por ave.</p> <p>Todas las aves susceptibles deben ser vacunadas al mismo tiempo.</p> <p>Evitar condiciones estresantes durante y después de la vacunación.</p> <p>Esta vacuna contiene Gentamicina y Anfotericina B como preservantes.</p> <p>Desechar todos los frascos de vacuna abiertos que sobren después de la vacunación, ciñéndose a las respectivas regulaciones locales o nacionales.</p> <p>Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.</p>
-------------------------------	---

PERIODO DE RETIRO No vacunar dentro de los 21 días previos al sacrificio

ALMACENAMIENTO Almacene de 2 a 8°C. No congelar.

PRESENTACIÓN Viales conteniendo 15ml (1000 dosis) y 25ml (200 dosis)
Caja de 10 presentaciones

AVISO

Seguir las indicaciones para la edad de administración cuidadosamente. El uso de esta vacuna en aves de menos de 3 semanas de edad puede causar síntomas clínicos de Anemia Infecciosa de Pollo. El uso de esta vacuna en pollos mayores de 12 semanas de edad puede resultar en transmisión vertical a la progenie.

NOTA

Esta vacuna ha sido sometida a pruebas estrictas de potencia, seguridad y pureza y cumple con los requisitos de Ceva Biomune. La respuesta a la vacunación depende de muchos factores, incluyendo pero no limitados a, condiciones del almacenamiento de la vacuna y manejo por el usuario, administración de la vacuna, salud y respuesta individual de aves y grado de exposición en el campo.



Fabricado por:

BIOMUNE Co.
Lenexa, Kansas, 66215, Estados Unidos

Importado y Distribuido por:

En Colombia: Ceva Salud Animal SAS, Bogotá. Reg ICA 6145-BV

En Ecuador: Representado por Rebexa S.A. El Calzado Calle S12 No. OE2-495 y Calle OE2L – Quito.
Reg. 4A-11623-AGROCALIDAD

En Perú: Ceva Salud Animal SAC, Calle José González 681, Miraflores, Lima. Reg. SENASA B.01.8.01.I.0597

En Venezuela: Ceva Salud Animal, C.A. J-29606988-3; Productos Swissagro, C.A. J-303108741.

Asesor Téc. MV Nerina Alliegro. Reg. No. INSAI2041PI34N074935