

**Vacuna de Encefalomiелitis – Viruela Aviar. Virus vivo**

Poximune® AE es una vacuna viva del virus de viruela aviar y vacuna viva del virus de encefalomiелitis aviar para la vacunación de pollos.

COMPOSICIÓN

Cada dosis contiene:

Virus de Viruela Aviar, Cepa gallina Cutler $\geq 10^{2.7}$ DITC₅₀

Virus de Encefalomiелitis Aviar, Cepa Calnek $\geq 10^{2.7}$ DITC₅₀

Excipientes c.s.p..... 1 dosis

ESPECIE DESTINO

Aves

INDICACIONES

Ayuda en la prevención de viruela aviar debida al virus de Viruela Aviar y encefalomiелitis aviar debida al virus de Encefalomiелitis Aviar.

**ADMINISTRACIÓN Y
DOSIFICACIÓN**

Administrar por el pliegue del ala a pollos saludables susceptibles de por lo menos 8 semanas de edad. Usar por lo menos 4 semanas antes del comienzo de la producción de huevos.

**PRECAUCIONES
GENERALES**

Contiene Gentamicina y Anfotericina B como preservantes.

Utilizar todo el contenido inmediatamente después de la rehidratación.

Todas las aves de una granja deben ser vacunadas al mismo tiempo.

Desechar todos los frascos de vacuna abiertos que sobren después de la vacunación, ciñéndose a las respectivas regulaciones locales o nacionales.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PERIODO DE RETIRO

No vacunar dentro de los 21 días previos al sacrificio

ALMACENAMIENTO

Almacene de 2 a 8°C. No congelar.

PRESENTACIÓN

Viales por 500, 1000 y 2000 dosis

Caja de 10 presentaciones



Fabricado por:

BIOMUNE Co.

Lenexa, Kansas, 66215, Estados Unidos

Importado y Distribuido por:

En Colombia: Ceva Salud Animal SAS, Bogotá. Reg ICA 6288-BV

En Ecuador: Representado por Rebexa S.A. El Calzado Calle S12 No. OE2-495 y Calle OE2L - Quito.

Reg. 4A-10935-AGROCALIDAD

En Perú: Ceva Salud Animal SAC, Calle José González 681, Miraflores, Lima. Reg. SENASA B.01.8.01.I.0827